

BILAG 1 KARAKTERISTIKA FOR NATURA 2000

Vurderingen af Sharco Duo OWF's indvirkning på Natura 2000-områder henviser til udvalgte Natura 2000 Special Protection Areas (SPA'er), der er beskyttet i henhold til fugledirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 3. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle) - kapitel 1.7.5.

Natura 2000 SPA'erne blev udvalgt på baggrund af en analyse af fordelingen af områder og den nærmeste omegn af OWF og refugiernes betydning og konnektivitet, baseret på data fra GDOŚ og EU's hjemmesider (<https://geoserwis.gdos.gov.pl>, <https://crfop.gdos.gov.pl>, <https://natura2000.eea.europa.eu>, <https://biodiversity.europa.eu>). Der blev henvist til de såkaldte indikatorarter, dvs. de adskilte beskyttelsesobjekter i Natura 2000 SPA'erne blandt de trækfugle, der blev taget i betragtning i vurderingen (vurderingens emner). Det blev antaget, at disse er målrefugier for beskyttede fuglearter, der migrerer i projektområdet. Resultaterne af opgørelsen og vurderingen af indikatoren: bevaringsværdi for individuelle vurderingsobjekter (bilag 1, kapitel 1.7) blev taget i betragtning. Fordelingen af andre planlagte OWF-projekter i umiddelbar nærhed af det betragtede projekt blev analyseret (kapitel 1.7). Referencen til internationalt vigtige fugleområder IBA (Important Bird Areas <https://datazone.birdlife.org>), beskyttede områder i Østersøen HELCOM BSPA (HELCOM Baltic Sea Protected Areas <https://maps.helcom.fi>) blev taget i betragtning.

Sharco Duo OWF's konsekvensvurdering i forbindelse med trækfugle (kapitel 8) henviser til 8 udvalgte Natura 2000 SPA'er (tabel 1, figur 1):

- 4 Polsk: Ławica Słupska PLC990001, Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002, Pobreże Słowińskie PLB220003, Zatoka Pomorska PLB990003;
- 1 Svensk: Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308;
- 1 Tysk: Pommersche Bucht DE1552401;
- 2 Dansk: Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne DK007X080, Ertholmene DK007X079.

Tabel 1 Placering af den planlagte Sharco Duo OWF i forhold til de betragtede Natura 2000 SPA'er

Nr.	Navn på NATURA 2000-område (Fugledirektivet, Natura 2000 SPA)	NATURA 2000 områdenummer	Minimumsafstand fra Sharco Duo OWF-områdets grænse [ca. km].
1	Slupsk Shoal	PLC990001	1,8 km
2	Kystfarvande i Østersøen	PLB990002	36,8 km
3	Pobreże Słowińskie	PLB220003	49,9 km
4	Pomeranian Bight	PLB990003	67,5 km
5	Hoburgs bank og Midsjöbankarna	SE0330308	30,2 km
6	Pommersche Bucht	DE1552401	118,5 km
7	Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne	DK007X080	79,8 km
8	Ertholmene	DK007X079	78,8 km

Slupsk Bank PLC990001 ligger tættest på grænserne for Sharco Duo OWF-koncessionsområdet (i en minimumsafstand på ca. 1,8 km), syd for OWF. Det er et værdifuldt beskyttet område, der er forbundet med andre lignende fuglereservater af europæisk betydning. Området mod syd er Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002, der strækker sig mod øst og vest og støder op til følgende refugier: Pobreże Słowińskie PLB220003 og Zatoka Pomorska PLB990003.

Området Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308, nord for OWF, ligger i en kortere afstand (ca. 30,2 km) fra Sharco Duo OWF - end de andre refugier mod sydvest, dvs: Pommersche Bucht

DE1552401, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne DK007X080, Ertholmene DK007X079 (Tabel 1, Figur 1).

Slupsk Shoal (PLC990001, IBA, HELCOM) i Østersøen er et af de vigtigste refugier for den overvintrende europæiske bestand af havlit (Durinck et al., 1994; Wilk et al., 2010; BirdLife International, 2018; Skov et al. 2011; Michalek et al. 2020), forbundet med andre områder af stor bevaringsmæssig betydning for arten (nationalt og internationalt) - fx Østersøens kystfarvande PLB990002, Pomeranian Bay PLB990003, Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308, Pommersche Bucht DE1552401.

Karakteristika for Natura 2000 SPA'er, som er opsummeret i tabellerne nedenfor (Tabel 2 - Tabel 9), blev udarbejdet i henhold til Standard Data Forms (SDF) fra GDOŚ (<https://crfop.gdos.gov.pl>) og EU (<https://natura2000.eea.europa.eu>, <https://biodiversity.europa.eu>) portaler [Downloaded: 24.01.2024].

--

Sharco Duo OWF: Bilag: Natura 2000 SPA Vigtigste datakilder:

Fugledirektivet - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 3. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0147>. Bilag I DP: Fugledirektivets bilag I - fuglearter, der er genstand for særlige bevaringsforanstaltninger vedrørende deres naturlige levesteder, herunder dem, hvis bevarelse kræver udpegnings af særlige beskyttelsesområder.

Lov af 16. april 2004 om naturbeskyttelse (dvs. lovtidende 2023, punkt 1336). <https://isap.sejm.gov.pl/>.

HELCOM kort- og datatjeneste. Downloadet fra: <https://maps.helcom.fi/website/mapservice/> (24.01.2024).

IBA fuglereservater. Vigtige fugleområder. BirdLife International, 2024. downloadet fra: <http://datazone.birdlife.org>. (24.01.2023).

NATURA 2000. Natura 2000-netværksdatabaser: portaler fra Generaldirektoratet for Miljøbeskyttelse (GDOŚ) <https://geoserwis.gdos.gov.pl>, <https://crfop.gdos.gov.pl> og fra Den Europæiske Union (EU) <https://natura2000.eea.europa.eu>, <https://biodiversity.europa.eu/sites/natura2000> [Downloaded: 24.01.2024].

NATURA 2000 SPA Natura 2000 (fugledirektivet). SPA Særligt Beskyttet Område / Fugledirektivet - Standard Data Form:

- SDF Slupsk Shoal PLC990001 (GDOŚ opdateringsdato 2024-01), Downloadet fra: GDOŚ <https://crfop.gdos.gov.pl> (24.01.2024).

- SDF Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 (GDOŚ opdateringsdato 2023-12), Downloadet fra: GDOŚ <https://crfop.gdos.gov.pl> (24.01.2024).

- SDF Pobreże Słowińskie PLB220003 (GDOŚ opdateringsdato 2024-01), Downloadet fra: GDOŚ <https://crfop.gdos.gov.pl> (24.01.2024).

- SDF Pomeranian Bay PLB990003 (GDOŚ opdateringsdato 2023-12), Downloadet fra: GDOŚ <https://crfop.gdos.gov.pl> (24.01.2024).


- SDF Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308 (EU first compilation date 2016-06), Downloaded from: EU <https://natura2000.eea.europa.eu> (24.01.2024).

- SDF Pommersche Bucht DE1552401 (EU-opdatering 2015-06), Downloadet fra: EU <https://natura2000.eea.europa.eu> (24.01.2024).

- SDF Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne DK007X080 (EU-opdatering 2015-12), Downloaded from: EU <https://natura2000.eea.europa.eu> (24.01.2024).

- SDF Ertholmene DK007X079 (EU-opdatering 2018-01). Downloadet fra: EU <https://natura2000.eea.europa.eu> (24.01.2024).

Sharco Duo OWF VVM-rapport (2024). Sharco Duo OWF-projektbeskrivelse, andre OWF'er planlagt i nærheden af projektet (pr. januar 2024).



Figur 1. Placering af Sharco Duo OWF-anlægget og andre planlagte OWF'er i umiddelbar nærhed - på baggrund af udvalgte Natura 2000 SPA'er, der indgår i vurderingen.

Tabel 2 Natura 2000 SPA Slupsk Shoal PLC990001

SPA Natura 2000 Slupsk Shoal PLC990001									
Natura 2000-området Slupsk Shoal PLC990001 dækker en vandmasse i den sydlige del af Østersøen, som er kendetegnet ved en varieret bund og forskellige bentske samfund. Her findes levesteder i form af vadeblader og rev. Det dækker et område på 80969,72 ha (100 % havområde). Området er et vigtigt fuglereservat af europæisk rang E79. I vinterhalvåret og under forårs- og efterårstrækket forekommer mindst 1% af trækrutebestanden (C4) af 3 arter her: Tejsta, Havlit, Fløjlsand, og vandfugle forekommer i koncentrationer på mere end 20000 individer (C4). Ref: IBA Slupsk bank, HELCOM Lawica Slupska. Fuglearter: Områdets SDF lister 5 fuglearter (overvintrende og trækkende bestande), der kræver bevaringsforanstaltninger. SPA gør indsigelse mod beskyttelsen af 3 fuglearter (Tejst, Havlit, Fløjlsand).									
Avifauna				Befolkning i området		Vurdering af området			
Fuglearter omfattet af artikel 4 DP			Bilag I DP	type	størrelse (min-max)	Befolkning	Bevaringstilstand	Isolering	Overordnet
1	Tejst	<i>Cepphus grylle</i>		w	98-556 i	C	A	C	C
	Tejst	<i>Cepphus grylle</i>		c	72-461 i	C	A	C	C
2	Havlit	<i>Clangula hyemalis</i>		w	101148-231180 i	B	A	C	B
	Havlit	<i>Clangula hyemalis</i>		c	76440-214374 i	B	A	C	B
3	Den sortstrubede lom	<i>Gavia arctica</i>	-	w	93-173 i	D			
4	Den rødstrubede lom	<i>Gavia stellata</i>	-	w	28-66 i	D			
5	Fløjlsand	<i>Melanitta fusca</i>		w	5565-23611 i	B	A	C	B
	Fløjlsand	<i>Melanitta fusca</i>		c	910-1789 i	C	A	C	C
Indikationer: Populationstype: p - stillesiddende, r - producerer afkom, c - bevæger sig, w - overvintrer. Populationsstørrelse: i - individer, p - par. Populationsvurdering (intervaller i forhold til den nationale population) - A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: ubetydelig population. Vurdering af lokaliteten (vurdering af lokalitetens værdi for bevarelsen af arten) - A fremragende, B god, C betydelig. Kilde: SDF Slupsk Shoal PLC990001 (GDOŚ opdateringsdato 2024-01), Downloadet fra: GDOŚ https://crfop.gdos.gov.pl (24.01.2024).									

Tabel 3 Natura 2000 SPA Przybrzeżne wody Bałtyckie PLB990002

SPA Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyckie PLB990002									
Natura 2000-området Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 henviser til kystnære østersøfarvande af varierende dybde, med grænser langs en strækning på ca. 200 km, fra Hel-halvøen til den pommerske bugt. Det dækker et område på 194626,73 ha (99,99 % havområde). Området er et vigtigt fuglereservat af europæisk rang E80. I vinterhalvåret huser det mere end 1% af trækrutebestanden (C3) af Havlit og mindst 1% af Tejst og Fløjlsand. Derudover overvintrer 2 Lommer-arter (C7) i betydeligt antal: sortstrubede lom og rødstrubede lom. Link til Ramsar-område: Słowiński National Park (biosfærereservat). Link: IBA Central Polish coastal waters, HELCOM Baltic Coastal Waters. Fuglearter: Områdets SDF lister 9 fuglearter (overvintrende og trækkende bestande), der kræver bevaringsforanstaltninger. SPA-beskyttelsesobjekterne er alle listede fuglearter (Alken, Tejst, Havlit, Den sortstrubede lom, Den rødstrubede lom, Stormmåge, Fløjlsand, Sortand).									
Avifauna			Befolkning i området		Vurdering af området				
Fuglearter omfattet af artikel 4 i fugledirektivet			Bilag I DP	type	størrelse (min-max)	Befolkning	Bevaringstilstand	Isolering	Overordnet
1	Alken	<i>Alca torda</i>		w	5-10 i	C	B	C	C
2	Tejst	<i>Cephus grylle</i>		w	1-7 i	C	B	C	C
3	Havlit	<i>Clangula hyemalis</i>		w	2750-7150 i	C	B	C	C
4	Den sortstrubede lom	<i>Gavia arctica</i>	-	w	1-12 i	C	B	C	C
5	Den rødstrubede lom	<i>Gavia stellata</i>	-	w	1-100 i	C	B	C	C
6	Sølvmågen	<i>Larus argentatus</i>		w	1250-7300 i	B	B	C	B
7	Stormmåge	<i>Larus canus</i>		w	70-550 i	C	B	C	C
8	Fløjlsand	<i>Melanitta fusca</i>		w	1600-11700 i	C	B	C	C
9	Sortand	<i>Melanitta nigra</i>		w	350-3000 i	C	B	C	C
				c	3000 i	C	B	C	C
Indikationer: Populationstype: p - stillesiddende, r - producerer afkom, c - bevæger sig, w - overvintrer. Populationsstørrelse: i - individer, p - par. Populationsvurdering (intervaller i forhold til den nationale population) - A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: ubetydelig population. Vurdering af lokalitet (vurdering af lokalitetens værdi for bevarelsen af arten) - A fremragende, B god, C betydelig. Kilde: SDF Przybrzeżne wody Bałtyku PLB990002 (GDOŚ opdateringsdato 2023-12), Downloadet fra: GDOŚ https://crfop.gdos.gov.pl (24.01.2024).									

Tabel 4 Natura 2000 SPA Pobreże Słowińskie PLB220003

Pobreże Słowińskie SPA Natura 2000 PLB220003								
Natura 2000-området Pobreże Słowińskie PLB220003 omfatter Gardnerisko-Łebsko Spit, herunder de unikke kystbarker, de to største saltvandssøer Łebsko og Gardno, sammen med tilstødende enge, tørvemoser, skove og sumpskove. Området omfatter hovedkomplekserne i Słowiński National Park og Rowokół, der er forbundet af Łupawa-flodlej. Det dækker et område på 21819,43 ha (0,01% havområde). Området er et vigtigt fuglereservat af europæisk rang E09 (Slowinski NP). SPA'et er udpeget for forekomsten af mindst 25 fuglearter fra fugledirektivets bilag I, 15 arter fra den polske røde bog over dyr. I ynglesæsonen er det beboet af mindst 1% af den nationale bestand (C3 og C6) af følgende fuglearter: Havørnen (PCK), Kongeørnen (PCK), Fiskeørn (PCK), Stor hornfugl (PCK), strandskade (schinzii) (PCK), Stor præstekrave (PCK); i relativt høj tæthed (C7) forekommer Hedehøg, den sortryggede Skarve. Mindst 1% af trækrutebestanden (C2 og C3) af arterne forekommer i trækeperioden: Lille skallesluger (<i>Mergellus albellus</i>) (ca. 2%), Tranen (>3%), Sædgåsen (>4%) og Stor skallesluger, Blisgåsen og Lille skallesluger forekommer i relativt høje tætheder (C7). Link til Ramsar-område: Slowinski Nationalpark (biosfærereservat). Henviser til HELCOM Ostoja Slowinska. Fuglearter: Områdets SDF indeholder en liste over 36 fuglearter (stationære, ynglende og trækkende bestande), som kræver bevaringsforanstaltninger. Der er 14 fuglearter beskyttet i SPA (Blisgåsen, Sædgåsen, Kongeørnen, Taffeland, Stor hornugle, Stor præstekrave, Engsnarre, Sangsvanen, Tranen, Sølvmågen, Skallesluger, Stor skallesluger, Rød glente, Skarven).								
Avifauna			Befolkning i området			Vurdering af området		
Fuglearter omfattet af artikel 4 DP			Bilag I DP	type	størrelse (min-max)	Befolkning	Bevaringstilstand	Isolerings
1	Perleugle	<i>Aegolius funereus</i>	-	p	1 i	D		
2	Lille skallesluger	<i>Anas penelope</i>		c		D		
3	Gråanden	<i>Anas platyrhynchos</i>		c		D		
4	Blisgåsen	<i>Anser albifrons</i>		c	1000-6200 i	C	C	C
5	Sædgåsen	<i>Anser fabalis</i>		c	3200-4500 i	A	A	B
6	Kongeørnen	<i>Aquila chrysaetos</i>	-	r	1 i	B	A	A
7	Lille skrigørn	<i>Aquila pomarina</i>	-	r	1 i	D		
8	Mosehornugle	<i>Asio flammeus</i>	-	p	1-2 i	D		
9	Taffeland	<i>Aythya ferina</i>		c	1-1500 i	C	A	C
10	Rørdrum	<i>Botaurus stellaris</i>	-	r	2-4 i	D		
11	Stor hornugle	<i>Bubo bubo</i>	-	p	5i	B	A	C
12	almindelige ryle	<i>Calidris alpina</i>	-	r		D		
				c	140 i	D		
13	Natrav	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-	r	30 i	D		
14	Stor præstekrave	<i>Charadrius hiaticula</i>		r	10 i	C	B	C
15	Hvid stork	<i>Ciconia ciconia</i>	-	r	15-25 i	D		
16	Sorter storken	<i>Ciconia nigra</i>	-	r	1 i	D		
17	Rørhøgen	<i>Circus aeruginosus</i>	-	r	7-9 i	D		
18	Blå kærhøg	<i>Circus cyaneus</i>	-	r		D		
19	Hedehøg	<i>Circus pygargus</i>	-	r	4-5 i	D		
20	Engsnarre	<i>Crex crex</i>	-	r	200-250 i	C	C	C
21	Sangsvanen	<i>Cygnus cygnus</i>	-	c	560 i	B	B	B
22	Tranen	<i>Grus grus</i>	-	c	7000 i	C	A	B
23	Havørnen	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	r	4 i	D		
				c	10-30 i	D		
24	Sølvmågen	<i>Larus argentatus</i>		r	400 i	B	C	C
25	Sildemågen	<i>Larus fuscus</i>		r	2 i	D		
26	Skallesluger	<i>Mergus albellus</i>	-	c	1700 i	B	B	C
27	Stor skallesluger	<i>Mergus merganser</i>		c	1-2100 i	C	C	C
28	Sort glente	<i>Milvus migrans</i>	-	r	1 i	D		

29	Rød glente	<i>Milvus milvus</i>	-	r	7-8 i	C	B	C	C
30	Fiskeørn	<i>Pandion haliaetus</i>	-	r	1 i	D			
31	Hvæpsevåge	<i>Pernis apivorus</i>	-	r	1 i	D			
32	Skarven	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>		r	200 i	C	B	C	C
33	Brushane	<i>Philomachus pugnax</i>	-	c	380 i	D			
34	Plettet rørvagtel	<i>Porzana porzana</i>	-	r	1-4 i	D			
35	Dværgterneren	<i>Sterna albifrons</i>	-	r	1-3 i	D			
36	Fjordterneren	<i>Sterna hirundo</i>	-	r	1-15 i	D			
Indikationer: Populationstype: p - stillesiddende, r - producerer afkom, c - bevæger sig, w - overvintrer. Populationsstørrelse: i - individer, p - par. Populationsvurdering (intervaller i forhold til den nationale population) - A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: ubetydelig population. Vurdering af lokalitet (vurdering af lokalitetens værdi for bevarelsen af arten) - A fremragende, B god, C betydelig. Kilde: SDF Pobrzeże Słowińskie PLB220003 (GDOŚ opdateringsdato 2024-01), Downloadet fra: GDOŚ https://crfop.gdos.gov.pl (24.01.2024).									

Tabel 5 SPA Natura 2000 Pommerske Bugt PLB990003

SPA Natura 2000 Pommerske Bugt PLB990003									
Natura 2000-området Pommerske Bugt PLB990003 dækker en omfattende vandmasse i Pommerske Bugt med en meget varieret havbund, herunder Oderbanken. Det dækker et område på 309154,92 ha (100 % havområde). I træk- og overvintringssæsonen har området mindst 1% af trækrutebestanden (C2, C3) af 9 arter: Toppede lappedykker, gråstrubede lappedykker, nordiske lappedykker, Lille skallesluger (<i>Mergellus albellus</i>), Havlit, Sortand, Tejst, Toppet skallesluger, Fløjlsand. I relativt høje antal (C7) er: sortstrubede lom og rødstrubede lom. For vådområdefugle er der estimeret koncentrationer på mere end 20000 individer (C4), med mere end 100000 individer om vinteren. Ref: IBA Pomeranian bay, HELCOM Pomeranian Bay. Fuglearter: SDF'en for området lister 11 fuglearter (overvintrende og trækkende bestande), der kræver bevaringsforanstaltninger. SPA-beskyttelsesobjekterne er alle listede fuglearter (Alken, Tejst, Havlit, Sortstrubede lom, Rødstrubede lom, Fløjlsand, Sortand, Toppet skallesluger, Nordiske lappedykker, Toppede lappedykker, Gråstrubede lappedykker).									
Avifauna				Befolkning i området		Vurdering af området			
Fuglearter omfattet af artikel 4 DP			Bilag I DP	type	størrelse (min-max)	Befolkning	Bevaringstilstand	Isolerings	Overordnet
1	Alken	<i>Alca torda</i>		c	1500-2500 i	C	C	C	C
				w	200-500 i	C	C	C	C
2	Tejst	<i>Cephus grylle</i>		w	3975 i	B	B	C	B
3	Havlit	<i>Clangula hyemalis</i>		w	60 i	A	C	C	A
4	Sortstrubede lom	<i>Gavia arctica</i>	-	c	500 i	C	C	C	C
				w	1875 i	C	C	C	C
5	Rødstrubede lom	<i>Gavia stellata</i>	-	w	900-1500 i	C	C	C	C
				c	500 i	C	C	C	C
6	Fløjlsand	<i>Melanitta fusca</i>		w	250 i	B	C	C	B
7	Sortand	<i>Melanitta nigra</i>		w	200 i	A	B	C	A
				c	2000-5000 i	A	B	C	A
8	Toppet skallesluger	<i>Mergus serrator</i>		w	3000 i	C	C	C	C
9	Nordiske lappedykker	<i>Podiceps auritus</i>	-	w	100-200 i	C	B	C	C
10	Toppede lappedykker	<i>Podiceps cristatus</i>		w	4180 i	C	C	C	C
11	Gråstrubede lappedykker	<i>Podiceps grisegena</i>		w	200-500 i	A	C	C	A
Indikationer: Populationstype: p - stillesiddende, r - producerer afkom, c - bevæger sig, w - overvintrer. Populationsstørrelse: i - individer, p - par. Populationsvurdering (intervaller i forhold til den nationale population) - A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: ubetydelig population. Vurdering af lokalitet (vurdering af lokalitetens værdi for bevarelsen af arten) - A fremragende, B god, C betydelig. Kilde: SDF Pomeranian Bay PLB990003 (GDOŚ opdateringsdato 2023-12), Downloadet fra: GDOŚ https://crfop.gdos.gov.pl (24.01.2024).									

Tabel 6 Natura 2000 SPA Hoburgs bank og Midsjöbankarna SE0330308

Natura 2000 SPA Hoburgs bank og Midsjöbankarna SE0330308									
Det svenske Natura 2000-område Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308 er et omfattende område, der dækker kysterne omkring Hoburgs Bank, Norra Midsjö og Södra Midsjö samt Ölands kystområde. Det dækker et område på 1051111,20 ha (100% havområde). SPA-området er det vigtigste overvintringsområde for fugle i Østersøen. Ref: IBA Southern Midsjö Bank, Northern Midsjö Bank, Bank of Hoburgs, HELCOM Northern Midsjöbanken. Fuglearter: SDF'en for området lister 3 fuglearter (overvintrende og trækkende populationer), der kræver bevaringsforanstaltninger. SPA-beskyttelsesobjekterne er alle de listede fuglearter (Tejst, Havlit, edderfugl).									
Avifauna				Befolkning i området		Vurdering af området			
Fuglearter omfattet af artikel 4 DP			Bilag I DP	type	størrelse (min-max)	Befolkning	Bevaringstilstand	Isolerings	Overordnet
1	Tejst	<i>Cephus grylle</i>		w	1000-5000 i	C	B	C	B
2	Havlit	<i>Clangula hyemalis</i>		w	200000-1000000 i	A	B	C	A
3	Edderfugl	<i>Somateria mollissima</i>		c	5000-50000 i	C	B	C	B
Indikationer: Populationstype: p - stillesiddende, r - producerer afkom, c - bevæger sig, w - overvintrer. Populationsstørrelse: i - individer, p - par. Populationsvurdering (intervaller i forhold til den nationale population) - A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: ubetydelig population. Vurdering af lokalitet (vurdering af lokalitetens værdi for bevarelsen af arten) - A fremragende, B god, C betydelig. Kilde: SDF Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308 (EU first compilation date 2016-06), Downloaded from: EU https://natura2000.eea.europa.eu (24.01.2024).									

Tabel 7 Natura 2000 SPA Pommersche Bucht DE1552401

Natura 2000 SPA Pommersche Bucht DE1552401									
Det tyske Natura 2000-område Pommersche Bucht DE1552401 omfatter den tyske del af Oderbredden og Adlergrund, som er af enestående betydning for fuglefaunaen. Det dækker et område på 200417,00 ha (100% havområde). Området er et af de 10 vigtigste overvintringsområder af international betydning for fugle i hele Østersøen. Det er det vigtigste overvintrings-, raste-, fødesøgnings- og fædningssted for havænder og dykkende arter i de tyske østersøfarvande. Ref: IBA Pommerske Bugt, HELCOM Pommersche Bucht-Rönnebank. Fuglearter: Områdets SDF lister 19 fuglearter (overvintrende og trækkende bestande), der kræver bevaringsforanstaltninger. Natura 2000-områdets bevaringsobjekter er alle de listede fuglearter (Alken, Tejst, Havlit, Den sortstrubede lom, Rødstrubede lom, Sølvmågen, Stormmåge, Sildemågen, Dværgmågen, Svartbagen, Hættemågen, Fløjlsand, Sortand, Skarven, nordiske lappedykker, Toppede lappedykker, gråstrubede lappedykker, edderfugl, Lomvie).									
Avifauna			Befolkning i området			Vurdering af området			
Fuglearter omfattet af artikel 4 DP			Bilag I DP	type	størrelse (min-max)	Befolkning	Bevaringstilstand	Isolerings	Overordnet
1	Alken	<i>Alca torda</i>		w	110 i	C	C	B	C
2	Tejst	<i>Cephus grylle</i>		w	220 i	A	C	C	A
3	Havlit	<i>Clangula hyemalis</i>		w	130000 i	A	B	C	A
4	Sortstrubede lom	<i>Gavia arctica</i>	-	w	700 i	A	B	C	A
5	Rødstrubede lom	<i>Gavia stellata</i>	-	w	750 i	B	B	C	B
6	Sølvmågen	<i>Larus argentatus</i>		c	1000 i	C	C	C	C
7	Stormmåge	<i>Larus canus</i>		c	320 i	C	C	C	C
8	Sildemågen	<i>Larus fuscus</i>		c	11-50 i	C	C	C	C
9	Svartbagen	<i>Larus marinus</i>		c	150 i	C	C	C	C
10	Dværgmågen	<i>Larus minutus</i>	-	c	130 i	B	B	C	B
11	Hættemågen	<i>Larus ridibundus</i>		c	11-50 i	C	B	C	C
12	Fløjlsand	<i>Melanitta fusca</i>		w	43000 i	A	B	C	A
13	Sortand	<i>Melanitta nigra</i>		w	170000 i	A	B	C	A
14	Skarven	<i>Phalacrocorax carbo</i>		c	100 i	C	B	C	C
15	nordiske lappedykker	<i>Podiceps auritus</i>	-	w	500 i	A	C	C	A
16	Toppede lappedykker	<i>Podiceps cristatus</i>		c	11-50 i	C	C	C	C
17	Gråstrubede lappedykker	<i>Podiceps grisegena</i>		w	170 i	A	C	C	A
18	Edderfugl	<i>Somateria mollissima</i>		w	130 i	C	C	C	C
19	Lomvie	<i>Uria aalge</i>		w	550 i	C	C	B	C
Indikationer: Populationstype: p - stillesiddende, r - producerer afkom, c - bevæger sig, w - overvintrer. Populationsstørrelse: i - individer, p - par. Populationsvurdering (intervaller i forhold til den nationale population) - A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: ubetydelig population. Vurdering af lokalitet (vurdering af lokalitetens værdi for bevarelsen af arten) - A fremragende, B god, C betydelig. Kilde: SDF Pommersche Bucht DE1552401 (EU-opdatering 2015-06), Downloadet fra: EU https://natura2000.eea.europa.eu (24.01.2024).									

Tabel 8 Natura 2000 SPA Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne DK007X080

Natura 2000 SPA Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne DK007X080									
Det danske Natura 2000-område Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne DK007X080 ligger i hjertet af Bornholm og er relativt stort og tæt. Det er et af de største skovkomplekser i landet, med en højere andel af nåleskov, med tilstedeværelse af dale, sprækker og klipper, tørvemoser og søer. Det dækker et område på 6084,00 ha (0% havområde). Refugiet er af stor naturmæssig betydning for Danmark såvel som på europæisk plan. Attraktive levesteder for fugle udgøres af forskellige områder, herunder sump, eng og hede. I Danmark er det det område, der har størst ornitologisk betydning, især for mange skovarter, f.eks. skovsneppe (<i>Scolopax rusticola</i>). Ref: IBA Almindingen. Fuglearter: Områdets SDF opregner 14 fuglearter (stedfaste, ynglende og trækkende), som kræver bevaringsforanstaltninger. Ni fuglearter (Perleugle, Rørhøgen, Engsnarre, Sortspætten, Tranen, Rødrygget tornskade, Rød glente, Hvepsevåge, Plettet rørvagtel) er omfattet af SPA-beskyttelse.									
Avifauna			Befolkning i området			Vurdering af området			
	Fuglearter omfattet af artikel 4 DP		Bilag I DP	type	størrelse (min-max)	Befolkning	Bevaringstilstand	Isolerings	Overordnet
1	Perleugle	<i>Aegolius funereus</i>	-	p	1-3p	A	B	B	A
2	Rørdrum	<i>Botaurus stellaris</i>	-	r	3 p	D			
3	Natravn	<i>Caprimulgus europaeus</i>	-	r	0-3 p	D			
4	Rørhøgen	<i>Circus aeruginosus</i>	-	r	10 p	B	A	C	A
5	Blå kærhøg	<i>Circus cyaneus</i>	-	c	0-4 i	D			
6	Engsnarre	<i>Crex crex</i>	-	r	1-2 p	C	A	B	B
7	Sortspætten	<i>Dryocopus martius</i>	-	p	1 p	B	B	B	A
8	Tranen	<i>Grus grus</i>	-	r	8-12 p	A	A	C	A
9	Havørnen	<i>Haliaeetus albicilla</i>	-	c	1-3 i	D			
10	Rødrygget tornskade	<i>Lanius collurio</i>	-	r	15-25 p	C	B	B	B
11	Rød glente	<i>Milvus milvus</i>	-	c	0-3 p	B	A	B	A
				r	3 i	D			
12	Fiskeørn	<i>Pandion haliaetus</i>	-	c		D			
13	Hvepsevåge	<i>Pernis apivorus</i>	-	r	2 p	C	A	C	B
14	Plettet rørvagtel	<i>Porzana porzana</i>	-	r	1-3 p	B	A	C	B
Indikationer: Populationstype: p - stillesiddende, r - producerer afkom, c - bevæger sig, w - overvintrer. Populationsstørrelse: i - individer, p - par. Populationsvurdering (intervaller i forhold til den nationale population) - A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: ubetydelig population. Vurdering af lokalitet (vurdering af lokalitetens værdi for bevarelsen af arten) - A fremragende, B god, C betydelig. Kilde: SDF Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne DK007X080 (EU-opdatering 2015-12), Downloaded from: EU https://natura2000.eea.europa.eu (24.01.2024).									

Tabel 9 Natura 2000 SPA Ertholmene DK007X079

Natura 2000 SPA Ertholmene DK007X079									
Det danske Natura 2000-område Ertholmene DK007X079 er Danmarks østligste øgruppe. Det omfatter ø-komplekset Christiansø, Frederikø og Græsholmen, hovedsageligt med et klippelandskab, med søer, sparsom vegetation og naturlige revformationer omkring. Det dækker et område på 1256,00 ha (100% havområde). Området har ikke den store internationale betydning som fuglereservat. I stedet er det hovedsageligt rasteplass for Blåhals og Rødrygget tornskade. Refugiets unikke karakter i Danmark skyldes tilstedeværelsen af de eneste kolonier af Alken og Lomvie og den næststørste koloni af Edderfugl. Ref: IBA Ertholmene øst for Bornholm, HELCOM Bornholm: Ertholmene. Avifauna-arter: SDF'en for området viser 4 fuglearter (fastboende og trækkende), der kræver bevaringsforanstaltninger. Der er 2 fuglearter (Alken, Lomvie), der er Natura 2000-emner.									
Avifauna				Befolkning i området		Vurdering af området			
Fuglearter omfattet af artikel 4 DP			Bilag I DP	type	størrelse (min-max)	Befolkning	Bevaringstilstand	Isolerings	Overordnet
1	Alken	<i>Alca torda</i>		p	860-1100 p	A	A	B	A
2	Rødrygget tornskade	<i>Lanius collurio</i>	-	c	0-375 i	D			
3	Blåhals	<i>Luscinia svecica</i>	-	c	0-35 i	D			
4	Lomvie	<i>Uria aalge</i>		p	2500-2700 p	A	A	B	A
Indikationer: Populationstype: p - stillesiddende, r - producerer afkom, c - bevæger sig, w - overvintrer. Populationsstørrelse: i - individer, p - par. Populationsvurdering (intervaller i forhold til den nationale population) - A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: ubetydelig population. Vurdering af lokalitet (vurdering af lokalitetens værdi for bevarelsen af arten) - A fremragende, B god, C betydelig. Kilde: SDF Ertholmene DK007X079 (EU-opdatering 2018-01). Downloadet fra: EU https://natura2000.eea.europa.eu (24.01.2024).									