

Udpegningsgrundlag	Planår	Habitat og levevis (www.mst.dk/natur-vand/natur/)	Registrering og vurdering af påvirkning	Væsentlig påvirkning	Afværgeforanstaltninger
Natura 2000-område nr. 136					
Fuglebeskyttelsesområde nr. 105					
Rørdrum	2022-2027	Rørdrum yngler i tagrørsskove langs bredden af søer og vandløb. Det er vigtigt at disse tagrørsskove er uforstyrrede.	Projektområde ikke relevant for arten, da projektområdet ikke påvirker rørskov eller områder egnet til arten	Ingen	Ingen
Knopsvane	2022-2027	De overvintrende knopsvaner opholder sig ved de lavvandede kyster og i fjorde, hvor der er et rigeligt bunddække af vandplanter. Disse områder bruges også i juli-august, hvor svanerne fælder deres svingfjer. Knopsvanerne yngler overvejende i fjorde og ved lavvandede kyster. Især i fældningsperioden, hvor svanerne ikke kan flyve, er de meget følsomme over for forstyrrelser. Knopsvanen lever af vandplanter, især ålegræs og alger som søsalat, der græsses i lavvandede områder. Nogle steder ses knopsvaner dog også græssende på vinterafgrøder.	Der kan observeret knopsvaner i nærhed til projektområdet. Projektet påvirker ikke artens yngleområde, da projektet anlægges i dyrket mark. Arten kan fouragere i dyrket mark, men på grund af artens høje mobilitet, vurderes det at arten kan fouragere et andet sted, under anlægsarbejds periode.	Ingen	Ingen
Sangsvane	2022-2027	Når sangsvanerne ankommer til Danmark, søger de i de første par måneder især føde i søer og lavvandede fjordområder og vige, hvor de æder vandplanter. Derefter søger hovedparten af sangsvanerne føde på land, hvor de fouragerer på landbrugsafgrøder så som hvede- og rapsmarker, kartoffel- og roemarker og på græsmarker. Det er et krav til overvintringsstedet, at overnatningspladserne, det vil sige søerne og fjordene, er uforstyrrede.	Der kan observeret Sangsvaner i nærhed til projektområdet. Projektet påvirker ikke artens yngleområde, da projektet anlægges i dyrket mark. Arten kan fouragere i dyrket mark, men på grund af artens høje mobilitet, vurderes det at arten kan fouragere et andet sted, under anlægsarbejds korte periode. Projektområdet påvirker ikke overvintringsstedet.	Ingen	Ingen
Grågås	2022-2027	Inden trækket sydpå samles grågæssene på nogle få større rastepladser. Sådanne rastepladser er oftest en lagune eller en stor sø med nærliggende fødesøgningsområder, som f.eks. marker og enge. I Danmark holder de ynglende grågæs typisk til i næringsrige søer med rørskov, eller i skovmoser. Grågæs finder primært deres føde på land, som hovedsageligt består af græs og urter. Om vinteren suppleres føden med rester fra høsten på marker, som f.eks. korn og roer, hvorfor de ofte kan ses her i større flokke. I nogle tilfælde søger de også føde på uhøstede marker om sommeren	Der kan observeres grågæs i nærhed til projektområdet. Projektet påvirker ikke artens yngle- og rasteområde, da projektet hovedsageligt anlægges i dyrket mark. Arten vil derfor kun benytte projektområdet til fouragering. Arten kan fouragere i dyrket mark, men på grund af artens høje mobilitet, vurderes det at arten kan fouragere et andet sted, under anlægsarbejds korte periode.	Ingen	Ingen
Knarand	2022-2027	Arten er tilknyttet ferskvand eller svagt brakvand, hvor fourageringen består af bundvegetation og der til knyttet smådyr.	Projektet påvirker ikke artens fourageringsområde, da projektet sker i dyrkede marker	Ingen	Ingen
Skeand	2022-2027	Skeand er en træksfulg og yngler ikke i Danmark. Arten anvender vores kyster/fjorde og større søer til rasteområder, hvor den fouragere på lavt vand.	Projektområde ikke relevant for arten	Ingen	Ingen

Krikand	2022-2027	Ynglende krikænder er oftest at finde i små hedesøer og til tider i små damme på strandenge. Krinanden yngler hovedsageligt i næringsrige moser, søer og strandenge samt næringsfattige skovmoser.	Der er observeret krikænder i nærhed til projektområdet. Projektet påvirker ikke krikændernes foruagerings- og rasteområder, da projektet anlægges i dyrket mark.	Ingen	Ingen
Troldand	2022-2027	Troldænderne lever i søer og ved lavvandede og beskyttede kyster. Fuglene er oftest inaktive om dagen og trækker om aftenen til fourageringsområderne, som kan ligge langt fra dagrastepladserne. De troldænder der yngler her i landet, er oftest at finde i mindre søer, hvor bredvegetationen er tæt, men de kan også findes på små holme i brakvandsområder. I så fald yngler troldænderne ofte i kolonier, hvor der i forvejen er en hættemågekoloni.	Projektet påvirker ikke egnede yngleområder, da anlæggelsen sker i dyrket mark	Ingen	Ingen
Hvinand	2022-2027	Hvinænderne holder fortrinsvis til langs de lavvandede og beskyttede kyster, men kan også forekomme i større søer. For at et område er egnet som levested for hvinænder, skal der være relativt uforstyrrede fourageringsområder. Reden placeres i huller i træer, f.eks. i forladte sortspættehuller, men hvinanden benytter også redekasser.	Projektområde ikke relevant for arten	Ingen	Ingen
Lille skallesluger	2022-2027	Trækfugl der primært findes langs kyster, søer, fjorde og laguner. Artens fourageringsområde ligger inden for fuglebeskyttelsesområder med arten på udpegningsgrundlaget	Projektet påvirker ikke artens yngle- raste og fourageringsområde.	Ingen	Ingen
Stor skallesluger	2022-2027	Trækfugl der primært findes langs kyster, søer, fjorde og laguner. Artens fourageringsområde ligger inden for fuglebeskyttelsesområder med arten på udpegningsgrundlaget	Projektet påvirker ikke artens yngle- raste og fourageringsområde.	Ingen	Ingen
Havørn	2022-2027	Havørne yngler fortrinsvis i gammel løvskov i nærheden af fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige mængder af fisk og vandfugle, da fisk og fugle udgør størstedelen af ørnens fødegrundlag. Havørne er dog også kendt for at æde af ådsler. Havørne er sky fugle, der kræver, at deres redeområde er uforstyrret. Hvis ørnen forstyrres, mens den ruger, kan den finde på at opgive reden, og så går æggene tabt.	Projektet påvirker ikke egnede yngleområder, da anlæggelsen sker i dyrket mark	Ingen	Ingen
Rørhøg	2022-2027	Rørhøgene yngler i rørskove i moser og ved søer. Føden søger de over rørskoven og i det åbne land over dyrkede marker med vintersæd samt udyrkede områder med enge. Føden består hovedsageligt af mus og småfugle. Muligheden for uforstyrrede steder til placeringen af reden er vigtig for, at et område er egnet som ynglested for rørhøg.	Projektområde ikke relevant for arten, da projektet ikke vedrører rørskove.	Ingen	Ingen

Blishøne	2022-2027	I foråret danner blishøns par, og yngler ved søer, hvor de bygger rede i søbreddernes rørskov eller anden vegetation. I yngletiden er de meget territoriehævdende, både over for artsfæller og andre arter. Omvendt er de meget sociale om vinteren, hvor de samler sig i store flokke	Blishøne kan observeres inden for projektområdet. Da blishønen lægger rede i rørskov eller anden høj vegetation omkring søbredder, vurderes anlægsarbejdet ikke at påvirke arten væsentligt, da anlægsarbejdet sker på dyrket mark. Arten er meget mobil og kan søge føde andet sted, under anlægsperioden.	Ingen	Ingen
Klyde	2022-2027	Klyde yngler ved lavvandede fjordkyster og i laguner, hvor der er åbne enge med lav vegetation. Fuglene yngler i kolonier, ofte på småøer hvor ræve og andre rovdyr ikke kan nå ud eller på strandenge. Ynglesuccesen afhænger blandt andet af vandstanden, og pludselige oversvømmelser kan ofte være årsagen til fejlslagen yngel. Det er vigtigt, at kolonien er uforstyrret. Det gælder både i yngleperioden og i den periode, hvor fuglene fælder, lige inden de trækker sydpå igen.	Projektområde ikke relevant for arten.	Ingen	Ingen
Sorthovedet måge	2022-2027	Sorthovedet måge yngler i kystnært i kolonier sammen med hættele- og stormmåger. Arten yngler i den sydlige del af Danmark.	Projektet ligger langt fra kysten, hvor arten yngler. Derfor forventes projektet ikke at påvirke artens ynglemuligheder. Fouragerende eller trækkende individer kan føres omkring projektarealet. Arten er meget mobil og færdes andet sted under anlægsarbejdet.	Ingen	Ingen
Fjordterne	2022-2027	I modsætning til andre terner yngler fjordterne både ved saltvand og ferskvand. Fuglene holder gerne til i et lavt vegetationsdække på småøer og holme i fjord- og havområder samt ved søer og moser, og kolonierne findes ofte i havterne- og hættemågekolonier. Det er vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden.	Projektområde ikke relevant for arten	Ingen	Ingen
Havterne	2022-2027	Havterne yngler på småøer og holme, hvor der ikke er rovpattedyr, der kan æde æg og unger. Fuglene yngler i kolonier, og reden er tit placeret på den åbne sandstrand eller i sparsom og lav vegetation	Projektområde ikke relevant for arten	Ingen	Ingen
Dværgterne	2022-2027	Dværgterne yngler i kolonier på sandede eller grusede strande uden vegetation, men indimellem træffes arten også ved søbredder inde i landet. Fuglene lever af småfisk og andre små dyr, som de fanger ved dykning på lavt vand. Det er vigtigt, at der er ro omkring kolonien.	Projektområde ikke relevant for arten	Ingen	Ingen
Rødrygget tornskade	2022-2027	Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev, græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn.	Arten er fundet ynglende i området omkring Jægerspris Nordskov og Kohave, som ligger langt fra projektområdet. Projektet ligger primært i dyrkede marker uden det relevante mosaiklandskab, som arten anvender.	Ingen	Ingen

Fuglebeskyttelsesområde nr. 107					
Havørn	2022-2027	Havørne yngler fortrinsvis i gammel løvskov i nærheden af fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige mængder af fisk og vandfugle, da fisk og fugle udgør størstedelen af ørnens fødegrundlag. Havørne er dog også kendt for at æde af ådsler. Havørne er sky fugle, der kræver, at deres redeområde er uforstyrret. Hvis ørnen forstyrres, mens den ruger, kan den finde på at opgave reden, og så går æggene tabt.	Projektet påvirker ikke egnede yngleområder, da anlæggelsen sker i dyrket mark	Ingen	Ingen
Hvepsevåge	2022-2027	Arten yngler i ældre og større løvskove. Arten fouragere i nærhed til yngleområdet i lysåbne områder som enge, moser og skovlysninger.	Projektet påvirker ikke egnede yngleområder, da anlæggelsen sker i dyrket mark. Det kan ikke udelukkes at arten kan mobilisere sig ind over projektområdet, men arten kan foruagere andet sted, end hvor projektarbejdet udføres.	Ingen	Ingen
Sortspætte	2022-2027	Der er registreret sortspætte i skovene syd for Kikre Såby og Syd for Kirke Hvalsø.	Arten lever i ældre skove. Projektet påvirker ikke skovområder med forekomst af sortspætte.	Ingen	Ingen
Rødrygget tornskade	2022-2027	Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev, græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn.	Arten er fundet ynglende i området omkring Jægerspris Nordskov og Kohave, som ligger langt fra projektområdet. Projektet ligger primært i dyrkede marker uden det relevante mosaiklandskab, som arten anvender.	Ingen	Ingen